

FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019

PRODUCTO:
INFILTRAMAS



I. Nombre Comercial	: INFILTRAMAS
II. Ingrediente Activo	: Mezcla de agentes tenso-activo. Dodecil benceno sulfónico de trietanolamina, y derivados etoxilados de los alcoholes grasos
III. Tipo	: No corresponde
IV. Concentración	: 9 % Dodecil benceno sulfónico de trietanolamina; 1 % derivados etoxilados de los alcoholes grasos
V. Formulación	: Líquido
VI. Modo de Acción	: Surfactante y humectante de suelo
VII. Proveedor	: CHEMIE® S.A.
VIII. Autorización SAG	: No Corresponde
IX. Características	: INFILTRAMAS es un coadyudate y humectante de suelo, libre de sodio. Especialmente indicado para restablecer la humedad en aquellos suelos que han perdido su condición normal de humedad y para ampliar lateralmente el bulbo de mojamiento, aumentando la velocidad de infiltración del agua en el suelo. INFILTRAMAS optimiza el uso del agua y los nutrientes, mejora la distribución de los fertilizantes y productos fitosanitarios aplicado al suelo. Además mejora el infiltrado de sales y disminuye el escurrimiento superficial.
X. Compatibilidad	: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, pero se recomienda realizar pruebas de compatibilidad físicas de mezclas.
XI. Fitotoxicidad	: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019

PRODUCTO:
INFILTRAMAS



XII. Aplicaciones

:

Cultivo	Dosis L/ha	Momento de Aplicación y Observaciones
Uva de mesa, vinífera y pisquera, Limones, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas, Olivos, Paltos, Cerezo, Ciruelo, Avellano Almendro, Nogal, Kiwis, Duraznero, Damasco, Nectarín, Granado, Arándanos, Frambuesas, Moras, Grosellas, Frutillas, Zarparrillas.	3 - 6	Aplicar vía sistema de riego siguiendo el mismo criterio de fertirrigación. En caso de suelos muy secos repetir la aplicación a los 15 días a igual dosis. Se puede hacer una última aplicación al final de la temporada, antes de iniciar la fertiliza
Lechuga, Apio, Endivia, Acelga, Achicoria, Espinaca, Alcachofa, Brócoli, Colíflor, Repollo, Pepinos, Melones, Sandías, zapallos, zapallo italiano, Tomate, Pimentón, Ají, Papa, Cebollas, Ajos, Maíz, Espárragos, Arroz, Remolacha, Raps, Tabaco.	3 - 6	Aplicar vía sistema de riego siguiendo el mismo criterio de fertirrigación. En caso de suelos muy secos repetir la aplicación a los 15 días a igual dosis. Se puede hacer una última aplicación al final de la temporada, antes de iniciar la fertilización de post cosecha.

XIII. Precauciones

: Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en lugar fresco y aireado.