PRODUCTO:
FERTICHEM® FRUIT

CHEMIE® Innovación Agroveterinaria

I.	**Nombre Comercial**	: FERTICHEM® FRUIT
II.	**Ingrediente Activo**	: Fósforo y potasio
III.	**Tipo**	: FERTILIZANTES FOLIARES CONVENCIONALES Y ORGÁNICOS
IV.	**Concentración**	: Fósforo (P_2O_5).....25,00 % p/v Potasio (K_2O).....40,00 % p/v Enriquecido con ácidos fúlvicos, aminoácidos y microelementos (Cu, B, Mn, Zn, Fe)
V.	**Densidad**	: 1,4 – 2,0 g/ml
VI.	**pH**	: 8 – 9
VII.	**Formulación**	: Concentrado Soluble, SL
VIII.	**Modo de Acción**	: Absorción foliar
IX.	**Proveedor**	: Chemie® S.A.
X.	**Autorización SENASA**	: N/A
XI.	**Características**	: FERTICHEM® FRUIT es un nutriente foliar balanceado a base de fósforo (P) y potasio (K), los cuales son tomados por la planta en forma inmediata y traslocados a través de sus hojas y tallos; gracias al contenido de aminoácido, algas marimas y microelementos presentes en su composición. Posee un adecuado contenido de fósforo que estimula el sistema radicular, flor y semilla, además permite acelerar la madurez de la fruta. Por el alto contenido de potasio, se logra un mejor llenado de frutos u otros órganos cosechables. Especialmente recomendado para cultivos que tengan floración y cuajado a la vez, promoviendo así una adecuada floración, cuajado y llenado. FERTICHEM® FRUIT incrementa la floración y fructificación, mejora el color de las frutas, en especial en las manzanas y uvas, debido a que incrementan su nivel de antocianinas. FERTICHEM® FRUIT es un regulador de la acidez de las frutas, especialmente de los cítricos e incrementa el nivel de aceite en diversos cultivos.
XII.	**Compatibilidad**	: Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad y tolerancia.

XIII. Fitotoxicidad : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

XIV. Precauciones : Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar seguro, fresco y seco en su envase original debidamente cerrado y etiquetado, lejos de alimentos, medicinas. Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas.
Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C.

XV. Instrucciones de uso:

CULTIVO	DOSIS (L / 200 L)	RECOMENDACIONES
Alcachofa	0,5 – 1L	Macollamiento, inicio y llenado de inflorescencia.
Arroz	0,5 – 1L	Macollamiento, inicio de flor y llenado de granos.
Espárrago	0,5 – 1L	Aplicar en el desarrollo del1° y 2° brote.
Lechuga, Endivia, Col, Achicoria, Brócoli, Apio, Coliflor, Zanahoria.	0,5 – 1L	Aplicar a los30 y 45 días de la siembra.
Papa	0,5 – 1L	Aplicar en Pre floración y llenado de tubérculos.
Leguminosas	0,5 – 1L	Aplicar en pre floración, repetir 15 y 30 días después.
Melón, Sandía, Pepino	0,5 – 1L	Aplicar en pre floración, al cuajado y al llenado de frutos.
Tomate, Ají, Pimiento.	0,5 – 1L	Aplicar en pre floración, floración, cuajado, llenado y acabado de frutos.
Marigold	0,5 – 1L	Aplicar en pre floración, 50% de floración y 15 días después de la 2° aplicación.
Vid	0,5 – 1L	Aplicar en pre floración, al cuajado y al llenado de racimos.
Limón, Naranjo, Mandarino, Toronja (cítricos en general), Manzano, Melocotón.	0,5 – 1L	Aplicar en pre floración y al cuajado de los primeros frutos. Repetir a los 20 días de la 2° aplicación.

Mango	0,5 – 1L	Aplicar en pre floración, floración, cuajado, llenado y acabado de frutos.
Banano	0.5 –1L	Aplicar en pre floración, floración, cuajado, llenado y acabado de frutos.
Palto	0.5 –1L	Aplicar en pre floración, floración, cuajado, llenado y acabado de frutos.