

FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019

PRODUCTO:
BIRD PRO



I. Nombre Comercial	: BIRD PRO
II. Ingrediente Activo	: BIRD PRO está hecho a base de roble, ortiga, diente de león, alcohol
III. Tipo	: No corresponde
IV. Concentración	: No indicado
V. Formulación	: Líquido
VI. Modo de Acción	: Absorción foliar y radicular
VII. Proveedor	: CHEMIE® S.A.
VIII. Autorización SAG	: No Corresponde
IX. Características	: BIRD PRO es un Bioestimulante hecho a partir de preparados biodinámicos, extractos vegetales y compuestos orgánicos. BIRD PRO está recomendado para la agricultura orgánica y convencional. Uso válido para todo tipo de hortalizas y frutales. BIRD PRO tiene un efecto balanceador del complejo suelo - planta, fortaleciéndola frente al ataque de agentes externos. BIRD PRO no deja residuos en los cultivos. No tiene días de carencia, no tiene riesgo para la aplicación ni consumo. BIRD PRO está hecho a base de roble, ortiga, diente de león, alcohol. Almacénese en un lugar fresco, seco y oscuro. Mantener fuera del alcance de los niños, no ingerir
X. Compatibilidad	: No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible con productos fitosanitarios, sin embargo se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación a nivel de campo

FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019

PRODUCTO:
BIRD PRO



XI. Fitotoxicidad : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta

XII. Aplicaciones :

Cultivo	Dosis L/ha	Momento de Aplicación y Observaciones
Uva de mesa y Uva vinifera	0,250 (250 ml/ha)	1° aplicación: 5-7 días antes de inicio de pinta 2° aplicación: Inicio de pinta 3° aplicación: 5 - 10 días después de la 2° aplicación 4° aplicación: 7 - 10 días después de la 3° aplicación 5° aplicación: En caso de requerir extender el periodo de protecc
Cerezo	0,250 (250 ml/ha)	1° aplicación: Aplicar 7 días antes de amarillo pajizo 2° aplicación: 5 - 7 días después de la 1° aplicación 3° aplicación: 7 - 10 días después de la 2° aplicación 4° aplicación: 7 - 10 días después de la 3° aplicación
Carozos, Pomaceas, Frutos de hueso	0,250 (250 ml/ha)	1° aplicación: 5-7 días antes de inicio de inicio de madurez 2° aplicación: Inicio de pinta 3° aplicación: 7 - 10 días después de la 2° aplicación 4° aplicación: 7 - 10 días después de la 3° aplicación

Nota: Finalizar la temporada con la aplicación de BD en dosis de 250 ml/ha

XIII. Precauciones : Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en lugar fresco y aireado.