FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019

PRODUCTO:
BC-1000® SULFO

CHEMIE®
Innovación Agroveterinaria

I. Nombre Comercial	: BC-1000® SULFO
II. Ingrediente Activo	: Extracto de semilla y pulpa de toronja + Azufre
III. Tipo	: a-CETOLACTONAS / CALCÓGENOS
IV. Concentración	: 14,7 % p/p de Extracto de semilla y pulpa de cítrico(2,5 % p/p equivalente de ácido ascórbico); 85 % p/p de azufre
V. Formulación	: Polvo Seco, DP
VI. Modo de Acción	: Contacto (preventivo y curativo).
VII. Proveedor	: CHEMIE® S.A.
VIII. Autorización SAG	: 2.534
IX. Características	: Fungicida y bactericida natural a base de extracto de citricos con acción preventiva y curativa sobre hongos y bacterias.Actúa impidiendo la respiración de los patógenos, provocando al mismo tiempo la ruptura de la membrana celular de los microorganismos. Especialmente indicado para el control de Botrytis cinerea, pudrición ácida en uva de mesa, pisquera y uva vinífera. Por su característica de producto orgánico natural puede ser usado en la cosecha, sin problemas de residuos (0 días de carencia), asegurando una buena post cosecha. BC-1000® SULFO no necesita preparación, viene listo para ser usado directamente vía espolvoreo.
X. Compatibilidad	: BC-1000® SULFO es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola. Se ha reportado incompatibilidad con los siguientes productos: Dicofol, Methomyl. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba antes de mezclarlo en el estanque.
XI. Fitotoxicidad	: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta

XII. Aplicaciones :

Cultivo	Enfermedad	Dosis Kg/ha	Momento de Aplicación y Observaciones
Vid	***Botrytis cinerea***	**15 – 18**	**Plena flor, pinta, precosecha y cosecha.**
Vid	**Pudrición ácida**	**18 – 23**	**Pinta, precosecha y cosecha.**
Vid	**Oidio (preventivo)**	**15 – 18**	**Plena flor, pinta precosecha y cosecha. Aplicar dosis menor para prevenir el oidio y dosis mayor con indicio de la enfermedad**

XIII. Precauciones

: BC-1000® SULFO es un producto de baja toxicidad aguda, no corrosivo, no volátil, sin embrago, como medida preventiva se recomienda guardar el producto en su envase original, en un lugar seco, fresco y exclusivo para productos fitosanitarios. No vierta BC-1000® SULFO directamente a pozos, riachuelos, ríos o lagos. No reutilice los envases vacíos. No existe restricción en cuanto al tiempo que deba mediar entre la aplicación e ingreso de personas a animales al campo tratado, siembra o plantación del cultivo siguiente, ni los frigoríficos, cámaras u otros medios de almacenamiento, pues el producto no deja residuos por ser todos sus componentes de origen natural, sin embargo se recomienda esperar 4 horas.