

FICHA TÉCNICA

Página 1 de 2
Revisión: 10
Fecha Revisión: 04-06-2020

PRODUCTO:
FOLIACON



I. Nombre Comercial	: FOLIACON
II. Ingrediente Activo	: Nitrógeno, Calcio y Magnesio.
III. Tipo	: Fertilizante Foliar.
IV. Concentración	: Nitrógeno total 8.8 % p/p ~ 13,2 % p/v Calcio Total (CaO) 10 % p/p ~ 15,0 % p/v Magnesio total (MgO) 5 % p/p ~ 7,5 % p/v
V. Densidad	: 1,5 g/ml
VI. pH	: 6.0 ± 0.5
VII. Formulación	: Líquido.
VIII. Modo de Acción	: Absorción foliar y radicular.
IX. Proveedor	: Chemie® S.A.
X. Autorización SENASA	: N/A
XI. Características	: FOLIACON es un fertilizante mineral líquido a base de calcio, magnesio y nitrógeno. Proporcionando a la planta la entrega balanceada de nutrientes que permite: <ul style="list-style-type: none">- Prevenir y corregir desordenes fisiológicos como palo negro o uva débil.- Previene y corrige las carencias de calcio y magnesio.- Estimula el desarrollo vegetativo.- Uniformiza e incrementa el tamaño y el peso de los frutos.- Aumenta la firmeza y la vida post-cosecha de frutos y hojas. Se recomienda el uso durante el crecimiento de la vegetación y el engorde de los frutos.
XII. Compatibilidad	: Se puede aplicar juntos con cualquier tipo de agroquímicos y fertilizantes, excepto productos a base de fósforo o azufre (porque se formaría fosfato de calcio o sulfato de calcio que son sales insolubles, se recomienda realizar un ensayo previo en una pequeña parte del cultivo antes de tratar extensivamente.
XIII. Fitotoxicidad	: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

FICHA TÉCNICA

Página 2 de 2
Revisión: 10
Fecha Revisión: 04-06-2020

PRODUCTO:
FOLIACON



XIV. Precauciones : Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento óptimo en in intervalo de 0-45°C. mantener el envase en lugar fresco y aireado.

XV. Instrucciones de uso:

Cultivo	Aspersión foliar (L/Ha)	Momento de aplicación y Observaciones
Uva de mesa y vinífera	3- 5	En brotes de 20 a 40 cm y de 2 a 4 aplicaciones a partir de baya recién cuajada, dependiendo del historial de presencia de palo negro o de bayas débiles.
Cerezo y Durazno	2 -4	Antes y después de endurecimiento de carozo.
Manzano, Peral, Palto	3 -5	2 aplicaciones durante engorde de fruto.
Limonas, Naranjos, Mandarinos y Tangelos	3 -5	2 aplicaciones a partir de frutos de diámetro de 2 cm.
Arándano y Frambuesa.	2-4	Realizar 2 a 3 aplicaciones. Iniciar desde la mitad de crecimiento de los primeros frutos, repetir cada 7 - 10 días.
Hortalizas de Hoja (Lechuga, Repollo, Apio, Etc.)	2-3	Después de 10 días de trasplante.

Ficha técnica válida para Perú.