FICHA TÉCNICA

CHEMIE
Innovación Agroveterinaria

FUNGICIDAS

Línea ORGÁNICA

Nombre Comercial:	**BC - 1000® CUP S**
Ingrediente Activo:	Extracto de semilla y pulpa de toronja + Oxicloruro de Cobre +Azufre
Tipo:	Orgánico
Concentración:	Extracto de semilla y pulpa de cítrico: 9,8 % p/p (equivalente de ácido ascórbico 2,5 % p/p) Oxicloruro de Cobre: 17,28 % p/p (equivalente de ácido ascórbico) - Azufre: 63 % p/p
Formulación	Polvo Seco, DP
Densidad:	
pH:	
Solubilidad en agua:	
Modo de Acción:	Contacto (preventivo y curativo).
Proveedor:	CHEMIE® S.A.
Autorización SAG:	2.641
Carácteristicas:	**BC-1000® CUP S** es un fungicida- bactericida natural, con amplio espectro de acción, que controla en forma eficiente la pudrición ácida y botritis (*Botrytis cinerea*) en vides. **BC-1000® CUP S** contiene tres ingredientes activos en su formulación, con diferente modo de acción que no presentan resistencia cruzada; potenciando y reforzando el control simultáneo de enfermedades claves en vid, constituyendo una eficaz alternativa para evitar o retardar la aparición de razas de hongos y bacterias resistentes, siendo una herramienta para ser usada en programas anti-resistencia. **BC-1000® CUP S** no necesita preparación, viene listo para ser usado directamente vía espolvoreo. En general realizar las aplicaciones cada vez que existan condiciones predisponentes a la enfermedad. Se pueden realizar hasta 4 aplicaciones por temporada de cultivo, tanto para vid vinífera como para vid de mesa.
Compatibilidad:	Es compatible con pesticidas de uso común en la agricultura, sin embargo, deben transcurrir 3 semanas entre una aplicación de **BC-1000® CUP S** y una aplicación de aceite. Se ha reportado incompatibilidad con Dicofol y Methomyl. Es compatible con productos fitosanitarios, sin embargo, se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación a nivel de campo.

Fitotoxicidad: No se ha reportado fitotoxicidad en vid y otros frutales; no produce manchas y no altera el sabor de las frutas.
No presenta fitotoxicidad cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de usos de esta etiqueta. Evite su uso en condiciones de altas temperaturas (30 °C o más).

XV. Aplicaciones:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (Kg/ha)	Momento de Aplicación y Observaciones
Vid de Mesa	*Botrytis cinerea*	18 - 23	Aplicar en plena flor, fruto formado, pinta y pre-cosecha.
Vid ninífera	Pudrición ácida (complejo de hongos: Alternatia alternata, Aspergillyus niger, Penicillium herbarum, Mucor sp., Rhizopus stolonifer y bacterias: Acetobacter aceti, Gluco-noacetobacter hensenii)	18 - 23	Aplicar en pinta, precosecha y cosecha.
	Botrytis cinerea	18 - 23	Aplicar en plena flor a pinta.