FICHA TÉCNICA

CHEMIE
Innovación Agroveterinaria

FUNGICIDAS

Línea ORGÁNICA

Nombre Comercial:	**BC - 1000®** SULFO
Ingrediente Activo:	Extracto de semilla y pulpa de toronja y Azufre
Tipo:	ORGÁNICO
Concentración:	14,7 % p/p de Extracto de semilla y pulpa de cítrico (2,5 % p/p equivalente de ácido ascórbico); 85 % p/p de azufre
Formulación	Polvo Seco, DP
Densidad:	-
pH:	-
Solubilidad en agua:	-
Modo de Acción:	Contacto (preventivo y curativo).
Proveedor:	CHEMIE® S.A.
Autorización SAG:	2.534

Carácteristicas:

BC-1000® SULFO es un fungicida y bactericida, que corresponde a un extracto de semillas y pulpa de toronja, con muy baja toxicidad para el hombre y animales. Especialmente indicado para el control de las enfermedades y cultivos recomendadas en el cuadro de usos.
El número de aplicaciones del producto es de 3 a 5 veces por temporada de cultivo, dependiendo de condiciones climáticas adversas y de manejo del cultivo. La frecuencia de aplicación es de 7 a 10 días, dependiendo de la aparición de la enfermedad, si hay indicios, aplicar cada 7 días, en cambio sí es preventivo, aplicar cada 10 días.

Compatibilidad:

BC-1000® SULFO es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola. Se ha reportado incompatibilidad con los siguientes productos: Dicofol , Methomyl. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba antes de mezclarlo en el estanque.

Fitotoxicidad

No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

Aplicaciones:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (Kg/ha)	Momento de Aplicación y Observaciones
Vides	*Botrytis cinerea*	15 – 18	Plena flor, pinta, pre-cosecha y cosecha. Aplicar dosis mayores con enfermedad presente.
	Pudrición ácida	18 - 23	Pinta, pre-cosecha y cosecha. Aplicar dosis mayores con síntomas presentes.
	Oídio (preventivo)	15 – 18	Plena flor, pinta, pre-cosecha y cosecha. Aplicar dosis menor para prevenir el oídio y dosis mayor con inicio de la enfermedad.

Precauciones:

BC-1000® SULFO es un producto de baja toxicidad aguda, no corrosivo, no volátil, sin embrago, como medida preventiva se recomienda guardar el producto en su envase original, en un lugar seco, fresco y exclusivo para productos fitosanitarios. No vierta **BC-1000® SULFO** directamente a pozos, riachuelos, ríos o lagos. No reutilice los envases vacíos. No existe restricción en cuanto al tiempo que deba mediar entre la aplicación e ingreso de personas a animales al campo tratado, siembra o plantación del cultivo siguiente, ni los frigoríficos, cámaras u otros medios de almacenamiento, pues el producto no deja residuos por ser todos sus componentes de origen natural, sin embargo, se recomienda esperar 4 horas.