FICHA TÉCNICA

CHEMIE
Innovación Agroveterinaria

PROTECTORES SOLARES

ABSORCIÓN FOLIAR

Nombre Comercial:	KANNÜ 95®
Ingrediente Activo:	Caolín
Tipo:	Convencional
Concentración:	Caolín 95 % p/p
Formulación	Polvo
Densidad:	-
pH:	-
Solubilidad en agua:	-
Modo de Acción:	Aplicación foliar
Proveedor:	CHEMIE® S.A.
Autorización SAG:	No corresponde

Carácteristicas:

KANNÜ 95® es un producto elaborado en base a Caolín, el cual, gracias a sus propiedades físicas y especial formulación, permite reflejar y dispersar la luz solar en vegetales, árboles ornamentales y frutales. De esta manera la fotosíntesis y procesos biológicos de las células vegetales se mantienen en un estado óptimo de actividad,
disminuyendo el estrés por altas temperaturas y radiación.
KANNÜ 95® crea una barrera que recubre las hojas y frutos de los cultivos. Los pequeños cristales de Caolín permiten una homogénea distribución, logrando que la planta utilice la luz necesaria para su actividad de fotosíntesis y, la radiación en exceso sea reflejada al ambiente, lo que ayuda a que los procesos bioquímicos continúen de manera óptima. Esto se traduce finalmente en: cultivos menos estresados, plantas más vigorosas, con mayor tolerancia al estrés por radiación y temperatura, disminuyendo así, la caída de los potenciales de rendimiento en los cultivos.

KANNÜ 95® puede ser aplicado al igual que fertilizantes y/o productos fitosanitarios con equipos convencionales para pulverizar sobre las hojas y frutos de los cultivos en la zona. No es necesario y no se recomienda el uso de producto adherentes, la formulación de **KANNÜ 95®** está creada para adherirse naturalmente a los cultivos.

Compatibilidad:

KANNÜ 95 es compatible con la mayoría de los productos fertilizantes o fitosanitarios, sin embargo, en caso de cualquier mezcla, recomendamos hacer una prueba en pequeña superficie.
Es incompatible con productos de fuerte reacción ácida o alcalina, al igual que con productos que contengan aceites minerales.

Fitotoxicidad:

No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta

Aplicaciones:

Cultivo	Dosis (kg/ha)	Momento de Aplicación y Observaciones
Pomáceas: Manzanos y Perales	25	Una vez preparada la suspensión acuosa, la vía de aplicación puede ser vía pitón o nebulizadora. Importante que el calibre sea entre 35 - 40 mm y que el cultivo (follaje, frutos) quede totalmente cubierto y sea homogéneo. Frecuencia de aplicación: 15 - 21 días. Se debe realizar la última aplicación por lo menos 20 díasantes de la cosecha.
Cítricos: Limón, Naranja, Mandarina, Clementinas, Pomelos. Nogales, Olivos, Caquis, Viveros frutales, Granados y Avellanos.	25	Una vez preparada la suspen sión acuosa, la vía de aplicación puede ser vía pitón o nebulizadora. El mojamiento utilizado, debe ser el mismo que el para aplicar productos fitosanitarios. Importante que el cultivo (follaje, frutos) quede totalmente cubierto y sea homogéneo. Frecuencia de aplicación: 15 - 21 días. Se debe realizar la última aplicación por lo menos 20 díasantes de la cosecha.
Carozos: Duraznos, Nectarines y Cerezos.	25	Aplicación postcosecha: Una vez preparada la suspensión acuosa, la vía de aplicación puede ser vía pitón o nebulizadora. Frecuencia de aplicación: 15 días.
Pimiento, tomates y pepino.	25	Una vez preparada la suspensión acuosa, la vía de aplicación puede ser vía pitón o nebulizadora. El mojamiento utilizado, debe ser el mismo que el para aplicar productos fitosanitarios, 200-500 L/ha, según sea el desarrollo del cultivo. Importante que la aplicación sea con calibre mayor o igual a 10 mm de diámetro. Asegurarse que el cultivo quede totalmente cubierto y que sea en inicio de pinta y cuando el fruto comienza a virar a naranja. N° de aplicaciones por temporada: 3. Frecuencia de aplicación: 12 a 15 días. Se debe realizar la última aplicación por lo menos 10 días antes de la cosecha

Precauciones:

El manejo de este producto debe ser realizado al igual que un producto fertilizante o fitosanitario: Se debe evitar su inhalación, ingestión, el contacto con la piel, proyección en los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación usar guantes y botas de goma, delantal impermeable y protector facial