FICHA TÉCNICA

CHEMIE Innovación Agroveterinaria

FERTILIZANTES

ABSORCIÓN FOLIAR & RADICAL

Línea ORGÁNICA

Nombre Comercial:	**OrganiChem POTASIO**
Ingrediente Activo:	Potasio Orgánico.
Tipo:	Orgánico
Concentración:	Potasio: 14,6% p/v - Extracto de algas marinas: 5,2 % p/v
Formulación	Líquido
Densidad:	1,29 g/mL
pH:	5
Solubilidad en agua:	100%
Modo de Acción:	Absorción foliar y radicular
Proveedor:	CHEMIE® S.A.
Autorización SAG:	No corresponde

Carácteristicas:

ORGANICHEM® POTASIO es un fertilizante orgánico rico en potasio recomendado para aplicaciones en frutales, vides, cultivos y hortalizas. Está específicamente diseñado para prevenir y corregir deficiencias de Potasio. Este producto, gracias a su inmediata y total asimilación, es capaz de provocar un desvío de gran parte de los azucares formados en la hoja hacia el fruto, incrementando la graduación Brix de la cosecha, coloración y equilibrando su contenido en agua, mejorando por tanto su conservación.
Es conveniente iniciar su aplicación dirigida hacia los frutos a partir de floración, no en los momentos finales de cosecha, para lograr un perfecto equilibrio en fruto. El número de aplicaciones dependerá del estado de cultivo.

Compatibilidad:

ORGANICHEM® POTASIO es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios y fertilizantes foliares. Pero se recomienda realizar pruebas de compatibilidad físicas de mezclas. **ORGANICHEM® POTASIO** no es compatible con productos de pH ácido.

Fitotoxicidad:

No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

FICHA TÉCNICA

CHEMIE
Innovación Agroveterinaria

FERTILIZANTES

Aplicaciones:

Cultivo	Dosis mL/hL	Dosis L/ha	Momento de Aplicación y Observaciones
Uva de mesa, Uva vinífera y pisquera	250 - 300	2 - 4	Realizar 2 a 3 aplicaciones durante el crecimiento de bayas con intervalos de 10 -14 días
Cerezos, Ciruelos, Nectarines, Duraznos, Almendros, Avellano, Olivo	250 - 300	2 - 4	3 aplicaciones a partir del endurecimiento del carozo, repitiendo cada10 -14 días.
Limones, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas	250 - 300	2 - 4	Aplicar durante el crecimiento de primavera a dosis de 5 L/ha. Con deficiencias moderadas a severas repetir la aplicación 14 días después. Realizar entre 1 a 2 aplicaciones con dosis de 3 - 5 L/ha durante el crecimiento de frutos, con intervalos de 10 -14 días.
Manzanos, Perales, Membrillos, Nogales	250 - 300	2 - 4	Desde fruto con desarrollo intermedio hasta inicio de toma de color, cada 5 - 7 días, realizar 2 - 3 aplicaciones.
Kiwis	250 - 300	2 - 4	Realizar aplicaciones a partir de 6 a 8 semanas de caída de pétalos y repetir, si es necesario, con intervalos de 10 -14 días.
Paltos	250 - 300	2 - 4	Realizar múltiples aplicaciones hasta 30 días antes de cosecha
Arándanos, Frambuesas, Frutillas	250 - 300	2 - 4	4 Realizar 2 a 3 aplicaciones durante el crecimiento de los frutos, repetir cada 10-14 días.
Tomates, Pimientos, Berenjenas, Ají	250 - 300	2 - 4	2 - 4 Aplicar después frutos cuajados, repetir 4 aplicaciones cada 10 días.
Papas	250 - 300	2 - 4	2 - 3 aplicaciones desde floración hasta llenado de tubérculos.
Sandías, Melones, Zapallos, Pepino	250 - 300	2 - 4	2 - 3 aplicaciones desde floración hasta crecimiento y desarrollo del fruto.
Zanahorias	250 - 300	2 - 4	2 - 3 aplicaciones desde cuaja de fruto.
Brócoli, Coliflor	250 - 300	2 - 4	2 - 3 aplicaciones 30 días después del trasplante.
Cebolla, Ajos	250 - 300	2 - 4	En almacigo aplicar 20 días antes del trasplante. En campo definitivo, aplicar en formación de bulbos, en crecimiento y desarrollo de bulbos.
Alcachofas	250 - 300	2 - 4	Aplicar 30 días después del trasplante, a inicio de floración. Aplicar si se observan deficiencias.
Espárragos	250 - 300	2 - 4	Aplicar a inicio del primer brotamiento, a inicio del 2º brotamiento y 25 días antes del último riego para chapodo.
Arroz	250 - 300	2 - 4	En almacigo, aplicar 20 días después de la siembra. En campo definitivo aplicar 15-20 días después de trasplante y en llenado de grano.

Precauciones:

Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en lugar fresco y aireado.

Ficha técnica válida para Chile